

## **Un trichoblastome géant du cuir chevelu mimant un carcinome basocellulaire.**

Kalmi.N, Soughi.M, bennouna.Z, fajri.Z, el fid.K, Baybay.H, Douhi.Z, Elloudi.S, Mernissi.FZ

Service de dermatologie, CHU Hassan II, Fès ; Maroc

### **Introduction:**

Le trichoblastome est une tumeur annexe bénigne rare avec un aspect clinique déroutant .

Il survient sur les régions pileuses et se présente habituellement sous forme d'une lésion solitaire de moins de 2cm de diamètre.

Le trichoblastome géant est une variante rarement décrite dans la littérature.

Nous rapportons le cas d'une patiente qui présente un trichoblastome géant du cuir chevelu avec de multiples carcinomes basocellulaires (CBC) au niveau du visage .

### **Observation :**

Il s'agit d'une patiente de 56 ans qui a consulté pour une lésion unique et asymptomatique du cuir chevelu de 5 cm de diamètre évoluant depuis 12 ans. L'examen dermatologique a montré une plaque érythémateuse, pigmentée par endroit , infiltrée , à surface mamelonnée, parsemée de télangiectasies avec une ulcération centrale .La dermoscopie a objectivé un fond érythémateux , des nids ovoïdes ,une vascularisation arborescente, et une ulcération centrale .L'histologie est revenue en faveur d'un trichoblastome .Par ailleurs la patiente présente également des papules translucides et pigmentées par endroit au niveau de la région frontal et rétro-auriculaire avec à la dermoscopie la présence de points et globules bruns et des télangiectasies, l'histologie est revenue en faveur des CBCs .

### **Discussion :**

Le trichoblastome est une tumeur bénigne ,solitaire, petite et bien circonscrite qui se développe au niveau des zones pileuses, avec prédilection au niveau de la tête et le cou, et plus rarement le tronc et les extrémités proximales. Il peut survenir à tout âge, mais plus fréquemment chez les adultes (cinquième à septième décennies), sans prédilection de sexe.

La majorité des trichoblastomes ont une taille inférieure à 2 cm, mais on peut parfois observer des trichoblastomes géants, atteignant plusieurs centimètres telle que le cas de notre patiente .Cliniquement, le trichoblastome et le CBC peuvent être difficiles à différencier même à la dermoscopie, essentiellement dans la forme nodulaire , cependant un nombre plus élevé de nids ovoïdes et de globules gris-bleu sont plus retrouvés dans les CBC que dans les trichoblastomes.

L'examen histologique est primordial pour distinguer ces deux tumeurs. L'absence d'origine épidermique, un stroma plus visible avec des corps mésenchymateux papillaires proéminents et l'absence de zones de rétraction entre l'épithélium tumoral et le stroma sont des caractéristiques diagnostiques pour exclure un CBC. Dans la forme géante du trichoblastome l'exérèse doit être complète et large afin de prévenir les récives.

### **Conclusion:**

Cette observation, illustre une forme clinique rare de trichoblastome dit géant mimant un CBC chez une patiente présentant des CBCs multiples du visage .

En vue de sa ressemblance clinique et dermoscopique avec le CBC il faut savoir évoquer un trichoblastome car les traitements et le pronostic sont différents; il faut ainsi préconiser une exérèse large dans la variante géante du trichoblastome pour prévenir les récives .

### **Références :**

- Patel P, Nawrocki S, Hinthner K, Khachemoune A. Trichoblastomas Mimicking Basal Cell Carcinoma: The Importance of Identification and Differentiation. Cureus. 2020 May 25;12(5):e8272. doi: 10.7759/cureus.8272.
- Morillo, P. Manrique, S. Vildósola, A. Saiz, J.L. Artola, I. Bilbao, Tricoblastoma gigante, Actas Dermo-Sifiliográficas, Volume 97, Issue 7,2006

**Mots clé :** trichoblastome géant, CBC