

# Pemphigus végétant: différentes présentations cliniques

•FENDRI K, DIOUF A, DIAGNE F, DOGUE A, NOUFAK L, LY F, DIOP A, ; NDOUR N, DIALLO M  
•dermatologie et vénérologie, institut d'hygiène sociale, dakar,  
•Institut d'Hygiène Sociale, Dakar, Sénégal; Laboratoire de dermatopathologie, U.C.A.D  
•(Université Cheikh Anta Diop ) Dakar, Dakar, Sénégal

## INTRODUCTION

Le pemphigus végétant, est une variété rare de pemphigus profond. Le diagnostic repose sur l'aspect clinique, les données immunologiques et histopathologiques. Sa survenue sur terrain de grossesse est rare. Nous rapportons 02 cas de pemphigus végétant dont un sur terrain de grossesse.

## OBSERVATION

Nos deux cas étaient des femmes, âgées de 29 ans et 40 ans, l'une d'entre elles était enceinte de 23 SA. Les deux présentaient des lésions végétantes au niveau des grands plis et chez une des patientes il existait plus d'une centaine de pustules à côté des bulles. Des atteintes unguéales étaient présentes chez les deux patientes et une alopecie non cicatricielle. L'histopathologie était en faveur d'un pemphigus profond. Une forme de type Hallopeau était retenue chez l'une des patientes, contrastant avec une atteinte muqueuse. Un traitement à base de corticoïdes associés à la Dapsone dans un cas en raison de la cortico-résistance.

Pour la patiente qui était enceinte l'évolution était favorable avec un accouchement par césarienne à 32 SA+2 jours, d'un nouveau né prématuré indemne de toute lésion cutanée. Des récives étaient déclenchées par des infections : dermohypodermite bactérienne et vulvo-vaginite.

## CONCLUSION

Le pemphigus végétant est rare, avec un risque de prématurité lorsqu'il survient sur terrain de grossesse. Il y aurait une possibilité de co-existence des sous-types Hallopeau et Neumann. La dapsone est efficace en cas de corticorésistance et les infections provoquent des récives.



Fig.1: Patiente 1: multiples placards végétants avec aspect en chou fleur



Fig.2: Patiente 1: Plaques hyperkératosiques des mains



Fig.3: Patiente 2: Eruption bulleuse avec érosions



Fig.4: Patiente 2: Evolution sous traitement

## DISCUSSION

Le pemphigus végétant ne représente que 1 à 2 % des cas de pemphigus avec une nette prédominance féminine [1]. Son diagnostic est confirmé par l'examen histologique. La survenue du pemphigus au cours de la grossesse est rarement rapportée. Chez l'une de nos patientes une forme à type de pemphigus de Hallopeau était retenue. Dans cette forme l'atteinte muqueuse était rarement rapportée. Pour le traitement, les corticostéroïdes sont recommandés, l'efficacité de la dapsone en traitement adjuvant [2]. C'est une maladie relativement bénigne, avec une rémission prolongée mais des rechutes et des complications à type de prématurité peuvent être observées [3].

## References:

- 1.A. Abdou et al. Étude épidémioclinique d'une forme rare de pemphigus : pemphigus végétant CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc : P263
2. Almeida HL Jr et al .Pemphigus vegetans associated with verrucous lesions: Expanding a phenotype. Clinics (Sao Paulo) 2006;61:279-82
3. Gushi M et al. Neonatal pemphigus vulgaris. J Dermatol 2008;35:529—35.